



ຄູ່ມື

ເຕັກນິກການປູກຊາແບບຍືນຍົງ
(ເອກະສານສຳລັບຊາວກະສິກອນ)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



ຫ້ອງການໂຄງການຊາ SHAN

298F ກິມມາ, ບາດິງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ

ໂທ: +84-4-3843-1750

ແຟກ: +84-4-3843-1744

ເວບໄຊ: www.helvetas.org.vn

E-mail: helvetas.vietnam@helvetas.org

2015

ຄູ່ມື

ເຕັກນິກການປູກຊາແບບຍືນຍົງ
(ເອກະສານສາລັບຊາວກະສິກອນ)



ຜູ້ສ້າງລວມ

HELVETAS VIETNAM

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເຕັກນິກ

ເລືອງວັນເວືອງ ວິຊາການ ພະແນກປ້ອງການສັດຕະວະແພດ ທ້າຍຫຼ່ຽນ

ເລຕວານ ວິຊາການ ສູນສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຟູເທາະ

ລິວກວາງຢຸງ ວິຊາການບໍລິສັດ MTV ຊາຟອງຮາຍ ແຂວງລາວກາຍ

ດັງຫງ່ອກດາຍ ວິຊາການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນພັດທະນາຊາຕາມເດືອງ ແຂວງລາຍເຈົ້າ

ເຈີນທິຖຸຍ ວິຊາການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນພັດທະນາຊາຕາມເດືອງ ແຂວງລາຍເຈົ້າ

ຫວາງທິທຸເຮືອງ ຊ່ຽວຊານ HELVETAS VIETNAM

ຄຳນຳ

ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດອັນດັບທີ 5 ຂອງໂລກກ່ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກຊາຟຳເອົາວຽກເຮັດ ງານ ທຳ ແລະ ລາຍຮັບມາຊາວກະສິກອນຫລາຍລ້ານຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ພື້ນຜູ້ຜະລິດຊາຊົນຊົນ ຢູ່ທາງເຂດພູດອຍ ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດພູພຽງເລີມດົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະແໜງຊາຫວຽດນາມ ຍັງຄົງມີບັນຫາ ທີ່ບໍ່ມີຊັອນທີ່ສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນຕໍ່ກຳລັງການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ຄວາມສະອາດປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຂອງສະຖານະການຂັ້ນເທິງແມ່ນຍ້ອນຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານເຕັກນິກຂອງຜູ້ຜະລິດຊາ ຍັງມີໜ້ອຍສິ່ງ ດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຊາຫວຽດນາມຂາດຄວາມເຊື່ອຖືໃນຕະຫລາດສາກົນ.

ໃນສະຖານະການຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ທັງພາຍໃນປະເທດ ມີການແຂ່ງຂັນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ກັບຄວາມ ຕ້ອງການແມ່ນນັບມື້ນັບຫລາຍກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ເປັນສາເຫດທີ່ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດຊາຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີ ການປ່ຽນແປງ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຫ້ອງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາປະເທດສະວິດເຊີແລນ-SDC, HELVETAS VIETNAM ກຳລັງປະຕິບັດໂຄງການ “ພັດທະນາຊາຄຸນນະພາບສູງແນ່ໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນ ໃຫ້ກັບຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດພູສູງພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ, ລາວ, ມ່ຽນມາ” ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ ຜະລິດຊາຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການ ປຸກຊາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ຜູ້ປຸກຊາເປັນບັນຫາໃຈກາງທີ່ HELVETAS VIETNAM ກຳລັງປະຕິບັດ ເພາະນີ້ແມ່ນ ອົງ ປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຕັດສິນບັນຫາລາຄາຊາຫວຽດນາມ.

ບົນພື້ນຖານປະສົບການຕົວຈິງການປຸກຊາຢູ່ເຂດພູສູງພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ ດ້ວຍການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາ ຊ່ຽວຊານຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ສັດຕະວະແພດ, ບັນດາວິສາຫະກິດຊາ, HELVETAS VIETNAM, ເຂົ້າ ຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການປຸກຊາແບບຍືນຍົງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການປຸກຊາແບບຍືນຍົງ ປະກອບ ສ່ວນປັບປຸງກຳລັງການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບຊາ, ຄວາມສະອາດປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຍົກສູງຄຸນ ນະພາບ ແຮງງານ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ປະ ສະຈາກໄດ້ຂໍຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳເຫັນຈາກບັນກາຜູ້ອ່ານ ເພື່ອພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງເອກະ ສານສະບັບນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂໍຂອບໃຈ

ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ

ສາລະບານ

ພາກທີ 1. ການປູກ, ການດູແລຮັກສາຊາຂັ້ນພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນ.....	4
1.1. ການອອກແບບໂນນຊາ.....	4
1.1.1. ເລືອກດິນປູກຊາ.....	4
1.1.2. ອອກແບບສວນຊາ.....	4
1.1.3. ລະບົບທາງ, ຮ່ອງນ້ຳປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ.....	4
1.2. ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນຮົ່ມ, ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ເບ້ຍຊາ.....	5
1.2.1. ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນຮົ່ມ.....	5
1.2.2. ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ເບ້ຍຊາ.....	5
1.2.3. ປູກຕົ້ນໄມ້ຊັບຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວ.....	5
1.3. ເຕັກນິກການປູກ.....	5
1.3.1. ກະກຽມດິນປູກ.....	5
1.3.2. ລະດັບ, ໄລຍະຫ່າງ, ລະດູປູກຊາ.....	6
1.3.3. ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຫຼັງຈາກການປູກ.....	7
1.3.4. ພື້ນຖານການຕັດຕອນງ່າຊາ.....	8
1.3.5. ພື້ນຖານວິທີການເດັດຍອດຊາ.....	9
ພາກທີ 2. ການບົວລະບັດຮັກສາຊາໃນໄລຍະເວລາທີ່ເປັນເສດຖະກິດ.....	11
2.1. ການໃສ່ຝຸນຊີວະພາບ.....	11
2.2. ເຕັກນິກການເດັດຊາ.....	11
2.2.1. ເຕັກນິກການເດັດຊາຕາມລະດູການ.....	11
2.2.2. ວິທີການເດັດ.....	12
2.2.3. ວິທີການຮັກສາ ແລະ ຂົນສົ່ງຊາ.....	12
2.3. ເຕັກນິກການຕັດຊາວິສາຫະກິດ.....	13
2.3.1. ລະດູການຕັດ.....	13
2.3.2. ເຕັກນິກການຕັດ.....	14
2.3.3. ການດູແລຮັກສາສວນຊາຫລັງຈາກການຕອນ.....	15
2.4. ການຖາງຫຍ້າ, ການປົກດິນ, ການນຳໃຊ້ໃບທີ່ຕັດຕອນແລ້ວປົກດິນ, ການດູແລພະຍາດແລະໜອນຊາ.....	15
2.5. ປະກົດການຊາເຊື່ອມສະພາບ ແລະ ວິທີການຈັດການ.....	16
2.5.1. ປະກົດການຊາເຊື່ອມສະພາບ.....	16
2.5.2. ການຟື້ນຟູຊາເຊື່ອມຄຸນນະພາບ.....	16
ພາກທີ 3 ສັດຕູພືດ ແລະ ການຮັກສາ.....	18
3.1 ສັດຕູພືດປະເພດມີປີກ.....	18
3.2. ໂຕເພ້ຍສີຂຽວ.....	18
3.3 ແມງແຄງ.....	19
3.4 ແມງມຸນແດງນ້ອຍ.....	20
3.5. ແມງເພ້ຍສີດາ.....	20
3.6. ແມງບັ້ງຂົນທາລາຍຊາ.....	21
3.7. ໜອນສີແດງ.....	21

3.8. ເພັຍຂາວ, ເພັຍແດງ 22

3.9. ພະຍາດໃບໂພງ..... 22

3.10. ພະຍາດປາຍແຫ້ວ 23

3.11. ພະຍາດໃບແຫ້ງ..... 23

3.12. ພະຍາດໃບແຫ້ງແຫ້ວ..... 24

ພາກທີ 1

ການປູກ, ການດູແລຮັກສາຊາຂັ້ນພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນ

ພາກທີ 1. ການປູກ, ການດູແລຮັກສາຊາຂັ້ນພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນ

1.1. ການອອກແບບໂນນຊາ

1.1.1. ເລືອກດິນປູກຊາ

- ຊັ້ນດິນປູກຊາໜາ(ຫລາຍກວ່າ 50 ຊັງຕີແມັດ).
- ຄວາມສົມ (pH) ແຕ່ 4,5 – 5,5.
- ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນສູງກວ່າ 1 ແມັດ.
- ຄວາມຊັນ 5-200 ແມ່ນເໝາະສົມ.
- ດິນມີເສດໄມ້ໃບຫຍ້າ.
- ຖ້າດິນປູກຊາຊັນເກີນໄປຊັ້ນປູກຊາບາງແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕໍ່າ ແລະ ຕົ້ນຫ່ຽວແຫ້ງໄວ້.



ຊາທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ດິນທີ່ຊັນຫຼາຍ ແລະ ມີຊັ້ນດິນທີ່ບາງ

1.1.2. ອອກແບບສວນຊາ

- ແຖວຊາຊື່ຕາມເສັ້ນລະດັບແລ້ວແຕ່ຄວາມຊັນຂອງໂນນ.
- ຄວາມຊັນເບື້ອງລຸ່ມ 60 : ແຖວຊາຊື່ສຸດຢູ່ແຄມໜານ.
- ຄວາມຊັນແຕ່ 6 - 200: ແຖວຊາປູກຕາມເສັ້ນລະດັບ, ບັນດາແຖວຊາ ລຽນຂຶ້ນສະເໝີກັນ.
- ໄລຍະຫ່າງ:
 - ໜານຕໍ່ໜານ 1,3 – 1,4 ແມັດ.
 - ຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ 0,3 – 0,4 ແມັດ.



ຄວາມຊັນ 6-20°: ໜານຊາອອກແບບຕາມເສັ້ນລະດັບ

ເອົາໃຈໃສ່: ອີງຕາມຄວາມຊັນຂອງໂນນ ເພື່ອກຳນົດໄລຍະຫ່າງໃຫ້ເໝາະສົມ.

1.1.3. ລະບົບທາງ, ຮ່ອງນ້ຳປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ

- ທາງເວ້ນ: ສຳລັບລົດໄປມາ; ຫ່າງກັນ 30 – 50 ແມັດ ອີງຕາມສັນພູແມ່ນຕ້ອງມີ 1 ເສັ້ນທາງ; ໜ້າທາງກວ້າງ 3 ແມັດ, ງ່ຽງເຂົ້າ 6 – 70, ຊັນໄປຫາຮ່ອງນ້ຳ.
- ທາງທຽວ: ຕັດຕາມລວງຂວາງຫລືສະຫລ່ຽງໜານຊາ; ຫ່າງກັນ 150 – 200 ແມັດ; ໜ້າທາງກວ້າງ 3 – 4 ແມັດ ບໍ່ມີຮ່ອງນ້ຳ.
- ທາງປົວລະບັດຮັກສາ: ຢູ່ລະຫວ່າງໜານຕໍ່ໜານ, ຕັດຕາມລວງຂວາງຫລືສະຫລ່ຽງໜານຊາ, ຫ່າງກັນ 50 – 70 ແມັດ; ກວ້າງ 1,2 -1,3 ແມັດ; ບໍ່ມີຮ່ອງນ້ຳ.
- ສວນຊາທີ່ມີຄວາມຊັນສູງຕ້ອງເຮັດຮ່ອງເພື່ອປ້ອງກັນການກັດເຊາະຂອງດິນ.



ອອກແບບລະບົບທາງໄປມາ, ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ, ການຂົນສົ່ງສະດວກສະບາຍ ແລະ ລຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ

1.2. ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນຮົ່ມ, ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ເບ້ຍຊາ

1.2.1. ປູກໄມ້ເພື່ອເປັນຮົ່ມ

- ປູກພືດຕະກູນຖົ່ວ (ກ້ານດອກສີເຫຼືອງ, ກ້ານໃບແຫຼມ, ກ້ານດໍາ...) ເພື່ອເປັນຮົ່ມແລະ ຮັກສາສະພາບດິນ.
- ປູກພ້ອມກັບເວລາປູກຊາ.
- ສວນຊາ: ທຸກໆ 10 ແມັດ ແມ່ນປູກ 1 ຕົ້ນ ຫລື 6 – 8 ແຖວຊາ ປູກ 1 ແຖວຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເປັນຮົ່ມ.
- ໂນນຊາເຊື່ອມຄຸນນະພາບ, ດິນຊັນແມ່ນໃຫ້ປູກເພີ່ມຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຮົ່ມ.



ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຮົ່ມ ແລະ ພື້ນຟູສະພາບດິນ

1.2.2. ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ເບ້ຍຊາ

- ປະເພດຕົ້ນໄມ້ເໝາະສົມກັບດິນໂນນ, ປູກງ່າຍ, ປະລິມານຝຸ່ນ ສີຂຽວສູງ.
- ລະດູ: ປູກແມ່ນເດືອນ 2 – 3.
- ປະລິມານເມັດ: 10 – 15 ກິໂລກາມ/ເຮັກຕາ, ປູກເປັນແຖວລະຫວ່າງ 2 ໜ້າຊາ.
- ເກັບກ່ຽວ: ຕົ້ນສູງ 70 – 80 ຊັງຕີແມັດ ແມ່ນຕັດ:
 - ຕົ້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ເບ້ຍຊາແມ່ນຕັດຈຳດິນເອົາໃບປົກເບ້ຍຊາ.
 - ຕົ້ນຢູ່ລະຫວ່າງໜ້າຊາ: ຕັດຍອດ ແລະ ຈົ່ງຕົ້ນສູງ 30 – 40 ຊັງຕີແມັດ.
 - ຫຼັງຈາກ 2 ປີ ແມ່ນຕັດອອກອີກ ແລະ ຈົ່ງໄວ້ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍເປັນຮົ່ມໃຫ້ຕົ້ນຊາ.

ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມໃຫ້ຕົ້ນຊາ ທັງເປັນ



ການປັບສະພາບດິນ

1.2.3. ປູກຕົ້ນໄມ້ຊັບຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວ

- ສວນຊາທີ່ຫາກໍ່ປູກ 3 ປີ ທາອິດຄວນປູກພືດຕະກູນຖົ່ວຊັບຫວ່າງໃສ່ (ຖົ່ວດິນ , ຖົ່ວເຫລືອງ) ເພື່ອເປັນທັງການປະຫຍັດເນື້ອທີ່ແລະບໍ່ໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂຶ້ນ
- ຕົ້ນໄມ້ຕະກູນຖົ່ວແມ່ນມີຝຸ່ນເພື່ອປັບປຸງດິນໃຫ້ງອກງາມ
- ບໍ່ຄວນປູກມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ມັນດ້າງ ຊັບຫວ່າງໃສ່ ເພາະພຶດຊະນິດນີ້ຈະໄປຍາດສານອາຫານຈາກຕົ້ນຊາ.

1.3. ເຕັກນິກການປູກ

1.3.1. ກະກຽມດິນປູກ

- ເຮັດໃຫ້ດິນບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ, ຊຸດກະຕໍ່ໄມ້ ແລະ ຖົມຊຸມໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ(ເຮັດໃຫ້ດິນພຽງດີ) “ສະອາດ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າໂດກ ແລະ ເໝົາເປື້ອຍໄວ”.
- ຊຸດຮ່ອງ:
 - ກວ້າງ 0,4 -0,5 ແມັດ; ເລິກ 0,3 – 0,4 ແມັດ.
 - ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໜ້າດິນຕໍ່າກວ່າລະດັບໜ້າ 5 – 10 ຊັງຕີແມັດ.

- ລະດູກະກຽມດິນ
 - ກ່ອນປູກ 1 – 3 ເດືອນ ເມື່ອມີຝົນໜ້ອຍ.
 - ຄວນກະກຽມດິນໃນເດືອນ 11 – 12, ປູກຊາ ເດືອນ 3 – 4 ປີຕໍ່ໄປ.
- ຝຸ່ນຮອງພື້ນ
 - ຝຸ່ນຄອກ 20 – 30 ໂຕນ/ເຮັກຕາ;
 - ຝຸ່ນຮອງພື້ນ ໃສ່ກ່ອນປູກໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 30 ມັ້.



ກະກຽມດິນປູກ

1.3.2. ລະດັບ, ໄລຍະຫ່າງ, ລະດູປູກຊາ

- ໄລຍະຫ່າງປູກ:
 - ແຖວດຽວ: ແຖວຕໍ່ແຖວ 1,3 – 1,4 ແມັດ; ຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ 0,3 – 0,4 ແມັດ.
 - ແຖວຄູ່: ແຖວຕໍ່ແຖວ 1,6 ແມັດ; ລວງກວ້າງໃນການປູກຊາ 0,6 ແມັດ; ຕົ້ນຕໍ່ຕົ້ນ 0,5 ແມັດ(ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ 2 ແຖວຄູ່ແມ່ນ 40 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ: ອີງຕາມມາດຖານການປູກ, ແນວພັນ, ຮູບຮ່າງຂອງໜ້າດິນ.
- ມາດຖານການປູກ: ແມ່ນ 18.000-20.000 ຕົ້ນ/ເຮັກຕາ, ອີງຕາມແນວພັນ ແລະ ຄວາມຊັນຂອງສວນຊາ.
- ລະດູປູກ:
 - ລະດູບານໃໝ່: ປູກເດືອນ 3 – 4.
 - ລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ: ປູກເດືອນ 8 – 9, ດິທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ.
 - ເຂດພູດອຍປູກແຕ່ເດືອນ 5 – 8 ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ.



ຊາປູກແບບແຖວຄູ່

1.3.3. ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການປົວລະບັດຮັກສາຫຼັງຈາກການປູກ

- ຕົ້ນອ່ອນໄດ້ມາດຕະຖານ:
 - + ຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 8 – 10 ເດືອນ; ສູງ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ;
 - + ຕົ້ນສູງກວ່າ 25 ຊັງຕີແມັດ ແມ່ນໃຫ້ເດັດຍອດອ່ອນອອກກ່ອນທີ່ ຈະນຳໄປປູກ.
 - + ໃຫ້ມີ 8 – 10 ໃບຂຶ້ນໄປ.
 - + ເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃບຫຼາຍກວ່າ 2,5 ມິລິແມັດ.
 - + ຕົ້ນມີສີໝາກກະເບົາ > 50%, ເປືອກຍອດອ່ອນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ.
 - + ຍອດອ່ອນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີຮອຍຊ້ຳກ່ອນປູກ 15 ມື້.
 - + ຍັງມີດິນຕິດຮາກສົມບູນ; ຕົ້ນບໍ່ເປັນແມງ ສະອາດດີ.



ຕົ້ນອ່ອນໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດນຳໄປປູກ

- ເຕັກນິກການປູກ.
 - + ຂຸດເປັນເບົ້າ ຫຼື ໄຖເລິກ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ.
 - + ຈົກຖົງເບົ້າ (ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເບົ້າແຕກ), ນຳເອົາເບົ້າລົງໃນຊຸມໃຫ້ພຽງ ກັບໜ້າດິນ, ປິ່ນໃບຊາໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງຂອງລົມ.
 - + ບໍ່ຄວນໃຫ້ຮາກຊາຖືກກັບຝຸ່ນຮອງພື້ນໂດຍກົງ.
 - + ຖິ້ມດິນຄ່ອຍໆໃຫ້ພຽງກັບປາກຊຸມ.
 - + ຖິ້ມດິນອ້ອມຂ້າງເບົ້າເບົ້າໆໃຫ້ຕໍ່າກວ່າດິນຂ້າງຊຸມ 1 – 3 ຊັງຕີແມັດ.
 - + ໃຊ້ວັດຖຸ(ເຟືອງ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ...), ປົກເບົ້າຊາໜາປະມານ 8 – 10 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 20 -30 ຊັງຕີແມັດ.
 - + ຖ້າດິນແຫ້ງ, ມີແດດໃຫ້ຫົດນ້ຳເບ້ຍຊາກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປູກ.



ບໍ່ເຮັດເບົ້າແຕກ, ບໍ່ໃຫ້ຮາກຊາຖືກໂດຍກົງກັບຝຸ່ນຮອງພື້ນ

- ເບ້ຍຊາສຳຮອງ
 - + ສຳຮອງ 10-15%ຂອງເບ້ຍຊາທີ່ປູກໄປແລ້ວ.
 - + ໃນເວລາ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກປູກແລ້ວ: ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຖ້າເບ້ຍໃດຕາຍແມ່ນໃຫ້ປູກແທນໂລດ.
 - + ປູກໃນເວລາທີ່ຟ້າບົດ, ດິນຊຸ່ມ.
 - + ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຮັກສາເບ້ຍຊາສຳຮອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າທຽມກັບເບ້ຍຊາທີ່ປູກແລ້ວ.
- ປົກໜ້າດິນ
 - + ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນ, ຫຍ້າ, ຮັກສາລະດັບຄວາມຊຸ່ມ.
 - + ວັດຖຸນຳໃຊ້ປົກໜ້າດິນ: ເຟືອງ, ຕໍ່ເຟືອງ, ຫຍ້າ....
- ຖາງຫຍ້າ, ພວນດິນ.
 - + ຖາງຫຍ້າ 4-6 ເທື່ອ/ປີ.
 - + ຖາງຫຍ້າ ເມື່ອຫຍ້າຍັງອ່ອນ, ບໍລິເວນລຳຕົ້ນຊາແມ່ນໃຊ້ມີລົກຫຍ້າອອກ.
 - + ຖ້າຖາງຫຍ້າຊ້າຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າປົກຕົ້ນຊາ, ລົກຫຍ້າຕ້ອງແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຮາກອອກມານຳ.
 - + ດິນທີ່ປູກຕ້ອງໄດ້ພວນດິນເພື່ອໃຫ້ດິນງອກງາມ.

ເອົາໃຈໃສ່: ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮາກຊາທີ່ຍັງອ່ອນ.




ປົກໜ້າດິນຮັກສາລະດັບຄວາມຊຸ່ມ

1.3.4. ພື້ນຖານການຕັດຕອນງ່າຊາ

- ຈຸດປະສົງ: ສ້າງຮູບຊົງ, ເຮັດໃຫ້ງ່າສະເໝີກັນ, ເຮັດໃຫ້ລວງສູງຕົ້ນຊາສະເໝີກັນເພື່ອສະດວກໃນການເດັດ.
- ເລີ່ມຕັດຕອນງ່າຊາເມື່ອ 2/3 ຂອງຕົ້ນທີ່ມີລວງສູງ 65-70 ຊັງຕີແມັດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ຂອງຕົ້ນຫລາຍກວ່າ 1 ຊັງຕີແມັດ.
- ລະດູ: ເດືອນ 12 - ເດືອນ 1 (ຖ້າຫາກອາກາດໜາວຫລາຍແມ່ນໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາຕັດອອກໄປ).
- ເຕັກນິກການຕັດຕອນ:
 - ຄັ້ງທຳອິດ(ຊາ 2 ປີ): ແມ່ນຕອນລຳຕົ້ນສູງຈາກໜ້າດິນ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 30 -35 ຊັງຕີແມັດ(ຫລື ຫ່າງຈາກລຳຕົ້ນ 15 ຊັງຕີແມັດ).
 - ຄັ້ງທີ 2 (ຊາ 3 ປີ): ແມ່ນຕອນລຳຕົ້ນຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 30 -35 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຫ່າງຈາກໜ້າດິນແມ່ນ 40-45 ຊັງຕີແມັດ(ຫລື ຫ່າງຈາກລຳຕົ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ).
 - ຄັ້ງທີ 3: ຊາ 4 ປີ ແມ່ນຕອນຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 50 -55 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຫ້ທາງເທິງພຽງກັນດັ່ງຮູບ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເວລາຕັດຕອນ:

ຕັດງ່າຊາໃຫ້ມີຮູບຮ່າງທາງເທິງພຽງຂະໜານກັບໜ້າດິນ



1.3.5. ພື້ນຖານວິທີການເດັດຍອດຊາ

- ຊາອາຍຸ 1 ປີ: ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເດັດ
 - + ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 10-12: ໃຫ້ເດັດເອົາຍອດທີ່ສູງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດ.
- ຊາອາຍຸ 2 ປີ:
 - + ປະໃຫ້ໃບລ້ຽງລຳຕົ້ນ, ແຕ່ເດືອນ 1 – 5: ບໍ່ເດັດ.
 - + ແຕ່ເດືອນທີ 6 ຂຶ້ນໄປ: ເດັດຍອດທີ່ສູງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ.
- ຊາອາຍຸ 3 ປີ:
 - + ເດັດຄັ້ງທຳອິດ: ເດັດພຽງແຕ່ຍອດທີ່ສູງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດ.
 - + ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ເດັດຄືກັບຊາເສດຖະກິດ.
- ຕົ້ນຊາອາຍຸ 4 ປີ:
 - + ເດັດຄັ້ງທຳອິດ: ເດັດພຽງແຕ່ຍອດຊາທີ່ສູງກວ່າ 50-55 ຊັງຕີແມັດ.
 - + ຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ເດັດຄືກັບຊາເສດຖະກິດ.





ພາກທີ 2

ການບົວລະບັດຮັກສາຊາໃນໄລຍະເວລາທີ່ເປັນເສດຖະກິດ

ພາກທີ 2. ການບົວລະບັດຮັກສາຊາໃນໄລຍະເວລາທີ່ເປັນເສດຖະກິດ

2.1. ການໃຫ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ.

- ຝຸ່ນຊີວະພາບ(ຝຸ່ນຈາກການຫມັກຫລືຝຸ່ນຈາກຈຸລິນຊີ): ແມ່ນໃຫ້ຝຸ່ນ 3 ປີ/ຄັ້ງ.
- + ຝຸ່ນຊີວະພາບຫລືຈາກການຫມັກໃສ່ 25-30 ໂຕນ/ເຮັກຕາ;
- + 10ໂຕນ ຝຸ່ນຊີວະພາບ;
- + ຝຸ່ນຈຸລິນຊີ 2-3ໂຕນ/ເຮັກຕາ.



ກະກຽມຝຸ່ນຊີວະພາບນຳໄປໃສ່ສວນຊາ

2.2. ເຕັກນິກການເດັດຊາ

2.2.1. ເຕັກນິກການເດັດຊາຕາມລະດູການ



- ລະດູບານໃໝ່ (ເດືອນ 3-4): ເດັດປະໄວ້ 1 ໃບປາ + 2 ໃບແທ້, ເຮັດໃຫ້ເປັນຊົງຟຸ່ມພຽງ.
- ລະດູໃບໄມ້ລົ້ນ (ເດືອນ 5-10): ເດັດປະໄວ້ 1 ໃບປາ + 1ໃບແທ້, ເຮັດໃຫ້ເປັນຊົງຟຸ່ມພຽງ.
- ລະດູໜາວ (ເດືອນ 11-12): ເດືອນ 11 ເດັດປະໄວ້ໃບປາ, ເດືອນ 12 ເດັດທັງໃບປາ(ເດັດຈົນຫມົດ).
- ບັນດາຍອດອ່ອນທີ່ສູງກວ່າໜ້າຟຸ່ມແມ່ນໃຫ້ເດັດຍອດອ່ອນເພື່ອໃຫ້ຊົງຟຸ່ມໃບຊາເປັນໜ້າພຽງ.

ເອົາໃຈໃສ່:

- ເດັດຊາຖືກຕາມມາດຕະຖານແມ່ນ ເດັດ 1 ຍອດຈຸມ + 2-3 ໃບອ່ອນ;
ໃບຈຸມທີ່ກຳລັງຈະບານແມ່ນເດັດ 1-2 ໃບ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ປະໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງລະດູ;
- ການເດັດຊາແມ່ນເປັນການເຮັດໃຫ້ກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໃບຈຸມທີ່ກຳລັງຈະບານ ເພາະເວລາເດັດຍອດແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ແຕກໃບແລະຂະຫຍາຍຕົວເປັນໃບອ່ອນ.
- ອັດຕາສ່ວນໃບທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນເທົ່າກັບຈຳນວນໃບຈຸມທີ່ກຳລັງຈະບານ
- ຖ້າປະໄວ້ຫລາຍໃບຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາອ່ອນນ້ອຍລົງ, ຊົງພຸ່ມບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດໄດ້ງ່າຍ.

2.2.2. ວິທີການເດັດ

- ເດັດລະອຽດຕາມລຸ້ນໃບ: ເມື່ອ 70%-80% ໃບອ່ອນ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເດັດທັງຫມົດຂອງໃບອ່ອນ; ເວລາ 25-30 ມື້/ລຸ້ນ.
- ເດັດໃຫ້ເປັນລະບຽບໃຫ້ເປັນຟຸ່ມພຽງກັນ: ເດັດເມື່ອ 30% ໃບອ່ອນໄດ້ມາດຕະຖານ.

ຄັ້ງທຳອິດເດັດພຽງແຕ່ໃບອ່ອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ຫລັງຈາກນັ້ນກັບມາເດັດຊຸດທີ 2 ຂອງໃບອ່ອນທັງຫມົດ ໄລຍະເວລາແມ່ນ 7-10 ມື້/ຄັ້ງ



ເດັດຕາມລຸ້ນເມື່ອ 70-80% ຍອດຊາໄດ້ມາດຕະຖານ

ເອົາໃຈໃສ່:

- ບໍ່ຄວນເດັດໃບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ມົດພ້າ, ກ່ຽວ ເພາະຈະເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງໃບຊາ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ໃບຊາອ່ອນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
- ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາໃບຊາໃສ່ໃນເປົາປິດແຈບ, ບໍ່ຄວນຍັດແໜ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາມີກິ່ນເໝັນແລະມຸ່ນ.
- ເດັດໃຫ້ເປັນລະບຽບໃຫ້ເປັນຟຸ່ມພຽງກັນ: ອີງໃສ່ໄລຍະເວລາຂອງການເດັດແມ່ນສັ້ນ ສະນັ້ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ເວລາໃນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.

2.2.3. ວິທີການຮັກສາ ແລະ ຂົນສົ່ງຊາ



ບັນຈຸຊາໃສ່ເປົາເຮັດໃຫ້ຊາເນົາ



ປະຊາລົງພື້ນເຮືອນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະອາດ

- ເວລາທີ່ເດັດໃບຊາ
 - ບັນຈຸຊາດ້ວຍກະຕ່າ, ກະດິ່ງທີ່ມີຮູເພື່ອການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
 - ບໍ່ຍັດແໜ້ນເຮັດໃຫ້ໃບຊາມຸ່ນ, ມີກິ່ນເໝັນ.
 - ໃບຊາທີ່ເດັດແລ້ວຕ້ອງຖອກປະໄວ້ຜ້າບັດ, ກະຕ່າທີ່ໃຫຍ່, ປະໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ.
 - ບໍ່ຄວນເດັດໃບຊາເມື່ອເວລາຝົນຕົກ.
- ການຂົນສົ່ງ.
 - ບໍ່ຍັດໃບຊາສົດລົງໃນກະຕາ ຫລື ກະສອບ ຈົນແໜ້ນເກີນໄປ.
 - ເວລາຂົນສົ່ງຄວນບັນຈຸຊາໃສ່ໃນກະຕ່າທີ່ສະອາດ, ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
- ການຮັບສາໃບຊາສົດຢູ່ໃນໂຮງງານ:
 - ຖອກໃບຊາແລ້ວຊະອອກໃສ່ພາສະນະຮັກສາໃບຊາສົດ, ທາງດ້ານລຸ່ມມີພັດລົມເປົ່າອາກາດ, ທັງເທິງມີຫລັງຄາ.
 - ຫລືຊະໃບຊາໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເທິງພື້ນເຮືອນທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຫລັງຄາ.
 - ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນໃບຊາທີ່ຊະອອກແມ່ນ 20-30 ຊັງຕີແມັດ.
 - ບໍ່ຄວນຂຶ້ນຢຽບ, ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງເປີເປື້ອນປົນໃບຊາ.
 - ປັ້ນໃບຊາທຸກໆ 2-3 ຊົ່ວໂມງ; ຄວນນາໃຊ້ໄມ້ປ່ອງເຮັດເປັນຄາດເພື່ອປັ້ນໃບຊາ.



ຊາຫຼັງຈາກເດັດແລ້ວຕ້ອງປະໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ, 2-3 ຊົ່ວໂມງ ປັ້ນເທື່ອ 1




ແຮງງານບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ

2.3. ແຕ້ມນິກການຕັດຊາວິສາຫະກິດ.

2.3.1. ລະດູການຕັດ.

- ລະຫວ່າງກາງເດືອນ 12 ຂອງປີກ່ອນຮອດເດືອນ 1 ຂອງປີຖັດມາ(ກ່ອນປີໃຫມ່ຫວຽດ)
- ຕັດກ່ອນແລະ ຫລັງຈາກປີໃໝ່ຫວຽດພຽງແຕ່ 1 ອາທິດແມ່ນດີທີ່ສຸດ(ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15/12-29/12 ປະຕິທິນຫວຽດ).
- ຖ້າປີໃດອາກາດໜາວຫລາຍ, ມີນ້ຳໝອກແມ່ນໃຫ້ຕັດຊ້າກວ່າ, ຕັດຫລັງຈາກທີ່ອາກາດທີ່ບໍ່ມີນ້ຳໝອກແລ້ວ.
- ຕັດງ່າກ່ອນ ແລະ ຈຶ່ງຕັດຟຸ່ມນ້ຳຫລັງ. ຕັດຊາທີ່ເປັນເສດຖະກິດກ່ອນ, ຕັດຊາທີ່ເປັນພື້ນຖານນ້ຳຫລັງ.
- ຊາ SHAN ຕັດກ່ອນ, ຊາພູດອຍຕັດນ້ຳຫລັງ.

2.3.2. ແຕກນິກການຕັດ



- **ການຕັດຟຸ່ມຊາ**

- ຕັດທຸກປີ(ບໍ່ນັບການຕັດງ່າ ແລະ ກິ່ງ), ເມື່ອສວນຊາແຂງແຮງ, ມີໜ່ວຍແຫງແຕກອອກໜ້ອຍ, ຕັດເປັນຮູບຟຸ່ມພຽງ, ກະຕຸ້ນການເກີດໃບອ່ອນໃໝ່.
- ຮອຍຕັດໃໝ່ສູງກວ່າຮອຍຕັດເກົ່າ 5 ຊັງຕີແມັດ (2ປີທຳອິດ), 3 ຊັງຕີແມັດ(ບັນດາປີຕໍ່ມາ), 1-2 ຊັງຕີແມັດ ຫລື ປົວແປງລ້ຽງລຳຕົ້ນ (ເມື່ອເວລາລວງສູງຂອງຮອຍຕັດສູງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດ).



ຕັດໄດ້ມາດຕະຖານ



ຕັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

- **ການຕັດກິ່ງ**

- ຫລັງຈາກທີ່ຕັດຄຸມຫລາຍເທື່ອແລ້ວງ່າຊາປົ່ງໜ່ວຍໃໝ່ ເລີ່ມມີຍອດອ່ອນປົ່ງໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ທຳການຕັດກິ່ງ
- ວິທີຕັດຕອນ:
 - + ຮອຍຕັດສູງ 60-65 ຊັງຕີແມັດ (ສຳລັບຕົ້ນຊາທີ່ມີງ່າຫຼາຍ, ຍອດອ່ອນໜ້ອຍ)
 - + ຮອຍຕັດສູງ 70-75 ຊັງຕີແມັດ (ຕົ້ນຊາມີການຂະຫຍາຍຕົວຂ້ອນຂ້າງດີ ແຕ່ສູງເກີນໄປ)

- **ການຕັດງ່າ**

- ຫລັງຈາກທີ່ຕັດຕອນກິ່ງຫລາຍຄັ້ງແລ້ວ, ຕົ້ນຊາມີງ່ານ້ອຍຫລາຍ, ຍອດຊາເກີດຫ່າງກັນ, ຂະບວນການປົ່ງຍອດອ່ອນໜ້ອຍລົງ.
- ວິທີຕອນ: ຕອນຕົ້ນຊາໃຫຍ່ສູງຈາກໜ້າດິນ 40-45 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຊານ້ອຍອ້ອມຂ້າງກົກແມ່ນ ຕັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 55-60 ຊັງຕີແມັດ.

- **ການຕັດເທງົ້າ**

- ເມື່ອຕົ້ນຊາມີອາຍຸແກ່ແລ້ວ, ກິ່ງງ່າແຫ່ວຕາຍ, ຊາປົ່ງໃໝ່ຫຼຸດລົງ.
- ຕັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນຂຶ້ນໄປ 25-35 ຊັງຕີແມັດ.
- ຖ້າຕົ້ນຊາແຫ້ງກະແດ້ງ, ຕົ້ນຊາຫ່າງກັນຫລາຍໃຫ້ຜິນຜະລິດຕຳແມ່ນຄວນປູກໃໝ່.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ຕັດຕອນໃຫ້ຟຸ່ມຊາພຽງຂະໜານກັບໜ້າຟຸ, ຮອຍຕັດກ້ຽງຂາດຕິບໍ່ໃຫ້ ກິ່ງງ່າຫັກແລະໃບຂາດມຸ່ນ, ຟຸ່ມຊາພຽງງາມດີ.
- ຫລັງຈາກຕອນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ກວດຄົ້ນຮອຍຕອນຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕັກນິກແມ່ນໃຫ້ແປງຄືນ.
- ເມື່ອຊາຍັງບໍ່ທັນແຜ່ງາມດີແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຕັດຕອນເທື່ອ.
- ສໍາລັບສ່ວນຊາທີ່ມີການຂະຫຍາຍບໍ່ດີ, ຫ່ຽວແຫ້ງ, ໃບບໍ່ສົມບູນປົ່ງຫ່າງກັນແມ່ນຄວນຕອນຫ່າງກັນ 1 ປີ (ປີນີ້ຕອນປີຫນ້າບໍ່ຕອນພຽງແຕ່ແປງໃຫ້ຟຸ່ມພຽງກັນ)

2.3.3. ການດູແລຮັກສາສວນຊາຫລັງຈາກການຕອນ

- ໃຫ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ.
 - + ໄລຍະເວລາ: ຫ້າຍເດືອນ 12 ຕົ້ນເດືອນ 1 ໃຫ້ຝຸ່ນຊີວະພາບເພື່ອປັບປຸງດິນ.
 - + ປະລິມານຝຸ່ນ: ແຕ່ 15-25 ກິໂລກາມ/360ມ² ທຽບເທົ່າກັບ 450-650 ກິໂລກາມ/ເຮັກຕາ.
 - + ວິທີການໃຫ້ຝຸ່ນ: ຊຸດຮ່ອງໃສ່ຝຸ່ນລະຫວ່າງການຂອງ 2 ແຖວຊາ ຊຶ່ງຫ່າງຈາກຕົ້ນຊາ 10-15 ຊັງຕີແມັດແລ້ວຖິ້ມດິນ.
- ທຳຄວາມສະອາດຟຸ່ມຊາ, ຕັດຮອນງ່າ, ໃບຊາ...ພ້ອມທັງເອົາເຟືອງປົກໃຫ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ.
- ຫລັງຈາກຕອນ (5-10ມື້) ແມ່ນຊິດຢາປ້ອງກັນເພື່ອໃຫ້ຮອຍຕອນແຫ້ງໄວແລະບໍ່ຕິດເຊື້ອ.
- ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນນຳໃຊ້ຢາ Movento + Antracol ຫລື Boocdo ຫລື ຢາປ້ອງກັນເຊື້ອມີແຮ່ທອງ Cu ເປັນອົງປະກອບແມ່ນດີທີ່ສຸດ
- ນຳໃຊ້ຢາໃຫ້ຖືກຕາມຄູ່ມືການນຳໃຊ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ຄວນໃຫ້ຝຸ່ນຫລັງຈາກຝົນຕົກແລ້ວເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງ.
- ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີດິນແຫ້ງຫລັງຈາກໃຫ້ຝຸ່ນແລ້ວຕ້ອງຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ, ທົດນໍ້າ.
- ການເອົາເຟືອງປົກຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ຕົ້ນຊາຈະເປັນຜົນດີທີ່ສຸດສໍາລັບປະເພດຝຸ່ນຊີວະພາບ.

2.4. ການຖາງຫຍ້າ, ການປົກດິນ, ການນຳໃຊ້ໃບທີ່ຕັດຕອນແລ້ວປົກດິນ, ການດູແລພະຍາດແລະໝອນຊາ.

- ໃຫ້ກວດກາເປັນປະຈຳ ຈັດການກັບຫຍ້າທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕົ້ນຊາໃຫ້ສະອາດ.
- ລະດູຮ້ອນອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າອ່ອນປົ່ງຂຶ້ນໄວແລະຫລາຍ ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຕັດຫຍ້າເປັນປະຈຳດ້ວຍວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - + ໃຊ້ມີລິກຫລືໃຊ້ແວກຖາງຫຍ້າອ້ອມຂ້າງຕົ້ນຊາ.
 - + ໃຊ້ຈັກຕັດຫຍ້າ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຈັກຕັດຫຍ້າສະເພາະສວນຊາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຊາະເຈື່ອນ.
 - + ຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງແຖວຊາແມ່ນບໍ່ຄວນຕັດຫຍ້າຈົນຈຳດິນ
- ການປົກຮາກ: ໜາ 10-15 ຊັງຕີແມັດ; ວັດຖຸດິບທີ່ນຳໃຊ້: ເຟືອງ, ຕຳເຟືອງ, ໃບໄມ້, ຫຍ້າແຫ້ງ...

- ການນຳໃຊ້ໃບທີ່ຕັດຕອນແລ້ວປົກດິນ: ຫລັງຈາກການຕັດຕອນຊາ, ນຳໃຊ້ໃບແລະກິ່ງນ້ອຍຂອງໃບຊາປົກດິນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີການຟື້ນຟູ.
- ສັດຕູພືດຕົ້ນຕໍ: ຕົກແຕນນ້ອຍສີຂຽວ, ແມງແກງເຕີນ້ອຍ, ແມງມຸມແດງ, ແມງແດງ, ໃບເນົ່າ. ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມບັນດາສັດຕູພືດແລະພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕົ້ນຊາເພື່ອມີວິທີການຈັດການໃຫ້ທັນເວລາ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າກັບຕົ້ນຊາ
- ບໍ່ຄວນກຳຈັດຫຍ້າຈົນຫມົດກ້ຽງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີການເຊາະ ເຈື່ອນ
- ຄວນຖາງຫຍ້າກ່ອນທີ່ຫຍ້າຈະມີດອກຫລື ໝາກ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດ ໃຫ້ຄວບຄຸມການແຜ່ພັນຂອງຫຍ້າ.
- ສຳລັບສ່ວນຊາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕັດແຕ່ງຟຸ່ມໃຫ້ພຽງ, ຕົ້ນຊາແກ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ປູກຊາໃຫມ່ຊ້ອນໃສ່ແມ່ນຄວນປູກພືດຕະກູນຖົ່ວເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການ ເກີດຂອງຫຍ້າ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາບໍ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈື່ອນ ພ້ອມທັງເປັນການໃຫ້ທາດບຳລຸງໃຫ້ແກ່ຕົ້ນຊາ.



2.5. ປະກົດການຊາເຊື່ອມສະພາບ ແລະ ວິທີການຈັດການ.

2.5.1. ປະກົດການຊາເຊື່ອມສະພາບ.

- ສະແດງອອກ:
 - ຕົ້ນຊາແຫ້ວຕາຍ, ຍອດຊາຫ້ອຍ ແລະ ຫ່າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຫລຸດລົງ.
 - ເກີດມີກິ່ງນ້ອຍຫລາຍ, ງ່າແຫ້ວແຫ້ງ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ງ່າມີເຊື້ອຮາຕິດຢູ່, ໃບນ້ອຍ, ເຫລືອງ, ບໍ່ເປັນເງົາ.
- ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຊາເຊື່ອມສະພາບ.
 - ຍ້ອນດິນ: ການຂຸດຂຸມປູກບໍ່ເລິກພໍ, ດິນຊັນໂພດ, ມີຫີນຫລາຍ, ມີຊາຍ ແລະ ດິນສົ້ມ (pH) ຫລາຍ ກວ່າ 6,5.
 - ຍ້ອນການກຽມດິນ: ການກຽມດິນກ່ອນການປູກບໍ່ໄດ້ມາດຖານເຕັກນິກ, ການໄຖຕຳກວ່າ 40 ຊັງຕີແມັດ.
 - ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຝຸ່ນຮອງຟື້ນ,
 - ຍ້ອນປູກບໍ່ຖືກເຕັກນິກ
 - ຍ້ອນບໍ່ນຳໃຊ້ວິທີການປົກຮາກປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ, ບໍ່ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອຟື້ນຟູດິນ, ບໍ່ປູກ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ.
 - ຍ້ອນການຕັດຕອນ, ການເດັດບໍ່ຖືກເຕັກນິກ.

2.5.2. ການຟື້ນຟູຊາເຊື່ອມຄຸນນະພາບ.

- ການປັບປຸງລະດັບ:
 - ສວນຊາມີຊາປູກຖີ່ເກີນໄປ: ຕັດອອກແຖວ 1 ຫລື ລະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຕົ້ນແມ່ນຕັດອອກ 1 ຕົ້ນ.

- ສວນຊາຫ່າງກັນຫລາຍເກີນໄປ: ປູກຊ້ອນໃສ່. ກ່ອນປູກຊ້ອນໃສ່ແມ່ນໃຫ້ຂຸດເປັນຮອງຫລືເປັນຊຸມ 40x40 cm; ໃຫ້ຝຸ່ນຊີວະພາບແລ້ວຈຶ່ງປູກໃສ່.
- ດູແລຮັກສາສວນຊາ:
 - ໃຫ້ຝຸ່ນພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ
 - ຖາງຫຍ້າ, ກຳຈັດສັດຕູພືດ, ປົກຮາກຕົ້ນຊາເພື່ອຟື້ນຟູສວນຊາ.
 - ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮິ່ມເພື່ອຟື້ນຟູດິນ; ສຳລັບສວນຊາທີ່ຢູ່ເຂດອາກາດຮ້ອນຫລາຍ.
- ຕັດຕອນແຕ່ງກິ່ງງ່າ:
 - ຕັດງ່າສຳລັບສວນຊາທີ່ມີອາຍຸຕຳກວ່າ 15 ປີ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ.
 - ຕັດເຫງົ້າ ສຳລັບສວນຊາທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 15 ປີ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ.
- ບົວລະບັດຕົ້ນຊາໃຫ້ສົມບູນຄືນ: ກ່ອນໜ້າການຕອນ 1 ປີ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
 - ໃຫ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ 1 ໂຕນ/360m²
 - ຕັດຫຍ້າ, ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ, ປົກຮາກຕົ້ນຊາ ແລະ ບໍ່ເດັດຍອດ.



ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນຮິ່ມໃຫ້ສວນຊາ



ໄຖດິນເພື່ອຟື້ນຟູສວນຊາ



ພາກທີ 3

ສັດຕູພືດ ແລະ ການຮັກສາ

ພາກທີ 3 ສັດຕູພືດ ແລະ ການຮັກສາ

3.1 ສັດຕູພືດປະເພດມີປີກ

- ຜົນກະທົບ
 - ສັດຕູພືດໂຕນ້ອຍ, ຍາກທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ.
 - ມັນດູດຢາງອອກຈາກໃບຊາອ່ອນ, ຢູ່ໃນຕຳລຳຕົ້ນ.
 - ບ່ອນທີ່ມີຜົນກະທົບຢູ່ໜ້າຂອງໃບຊາແລະ ເທິງລຳຕົ້ນ ມັນຈະເປັນເສັ້ນກະຕູດກະຕິດສີໝາກກະເບົາແຫ້ງ, ເປັນເສັ້ນຂະໜາດຕາມລວງຂອງໃບຊາ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ : ໃບຊາແຂງ , ໃບໜາ, ນ້ອຍ, ເປັນສີຟ້າແກ, ເປັນຮອຍ, ປ່ຽນຮູບຮ່າງ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ : ໃບຊາແຂງ, ແຫ້ງງ່າຍ, ສະລາຍ, ໃບຊາອ່ອນຈະຫຼົ້ນງ່າຍແລະແຫ້ວໄວ.
 - ສັດຕູພືດປະເພດມີປີກຈະພັດທະນາໄວໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ, ແດດຫຼາຍ.
- ການປ້ອງກັນ
 - ປູກແລະອານຸລັກຮັກສາໃຫ້ແຂງແຮງ, ໃສ່ຝຸ່ນສະໝໍ່າສະເໝີ, ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນຮົ່ມທີ່ເໝາະສົມ
 - ທຸກໆປີຕ້ອງພູນດິນພ້ອມທັງຂ້າສັດຕູພືດ.
 - ເດັດໃບຊາປົກກະຕິ, ເດັດລະອຽດສຳລັບໃບຊາອ່ອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.
 - ຈະຂ້າສັດຕູພືດກໍຕໍ່ເມື່ອອັດຕາສ່ວນມີຜົນກະທົບກາຍ 10% ຫຼື ມີ 4-5 ໂຕ/ໃບ.



ອາການໃບຊາຖືກທຳລາຍຍ້ອນແມງໄມ້ປີກແຂງ

3.2. ໂຕເພຍສີຂຽວ



ເພຍສີຂຽວ

ຜົນກະທົບຈາກການທຳລາຍຂອງເພຍສີຂຽວ

- ຜົນກະທົບ
 - ມັນດູດເອົາສານອາຫານຈາກເສັ້ນໃຍໃຫຍ່ແລະເສັ້ນໃຍນ້ອຍຂອງໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ: ໃບແລະຍອດອ່ອນທີ່ພັດທະນາຊ້າ, ໃບຈະພັນເຂົ້າກັນ ແລະປ່ຽນສີເປັນສີແດງຊ້າ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ: ຍອດອ່ອນຈະກົງເຂົ້າກັນຄືຮູບເຮືອແຫ້ງແລະແຂງ, ໃບນ້ອຍ, ເປັນສີເຫຼືອງ, ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໃບແຫ້ງໄໝ້.
 - ໂຕເພີ່ມສີຂຽວຈະປາກົດເຫັນໃນຮອບປີ, ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນສະພາບອາກາດ ທີ່ແດດຮ້ອນ, ຊຸ່ມຊື່ນ ມີຝົນນໍ້າ.
- ການປ້ອງກັນ
 - ປູກແລະຮັກສາໃບຊາໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງເພື່ອປ້ອງກັນກັບໂຕເພີ່ມ.
 - ເອົາເພືອງປົກແລະໃສ່ຝຸ່ນສະໝໍ້າສະເໝີ.
 - ເກັບເດັດໃຫ້ໝົດຕາມລຸ້ນດຽວກັນ ແລະ ຕັດຂາດແຫຼ່ງອາຫານຂອງໂຕເພີ່ມຕາມສວນຊາຢູ່ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ.
 - ຂ້າຫຍ້າແລະທຳລາຍບັນດາຕົ້ນໄມ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສວນຊາ.
 - ເວລາໂຕເພີ່ມຂະຫຍາຍພັນ ເຮົາຕ້ອງເດັດໃບຊາດັ່ງກ່າວອອກໃຫ້ໝົດເພື່ອຫຼຸດປະລິມານການຂະຫຍາຍພັນຂອງໂຕເພີ່ມ.

3.3 ແມງແດງ



ອາການຍອດ ແລະ ໃບຊາຖືກທຳລາຍໂດຍແມງແດງ

- ຜົນກະທົບ
 - ມັນດູດສານອາຫານຈາກພາກສ່ວນອ່ອນຂອງໃບແລະໃບຈຸ່ມຂອງຊາກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຮອຍບາດ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ: ບັນດາໃບອ່ອນມີຮອຍບາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນຮູບຮ່າງ.
 - ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງໃບຈຸ່ມກົງເປັນກະຕຸດກະຕິດບໍ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແລະມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ບັນດາຍອດຊາລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
 - ປົກກະຕິຈະເຕົ້າໂຮມກັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍແຕ່ລະຟຸ່ມຂອງຕົ້ນຊາຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນທີ່ມັນຮິ່ມເຢັນ.
 - ມີຜົນກະທົບຫຼາຍໃນລະດູຝົນ, ປຽກຊຸ່ມ.
- ການປ້ອງກັນ
 - ປູກແລະອານຸລັກຮັກສາຕົ້ນຊາໃຫ້ແຂງແຮງໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ຄົບແລະຈຳແນກໃຫ້ສະໝໍ້າສະເໝີ.
 - ບໍ່ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮິ່ມຫຼາຍ, ຂ້າວັດສະພຶດ, ໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງອ້ອມຮອບສວນຊາ.
 - ເດັດໃບຊາທີ່ມີໄຂ່ແມງແດງແລະໂຕແມງແດງທີ່ຢູ່ຍອດຊາຖີ້ມ, ໃບຊາທີ່ໃກ້ຈະເດັດຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ຟ້າວເດັດ, ເດັດລະອຽດຍອດທີ່ມີຜົນຮ້າຍ=>ບໍ່ຕ້ອງສິດຢາ.
 - ຂ້າວັດສະພຶດສ້າງລະດັບຄວາມປອດໄປໃຫ້ສວນຊາ.

3.4 ແມງມຸມແດງນ້ອຍ



ຮອຍທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍແມງມຸມແດງນ້ອຍ



ແມງມຸມແດງນ້ອຍ

- ຜົນກະທົບ
 - ມັນອາໄສແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໃບຕອງຈິງແລະໃບແກ່
 - ມັນດູເອົາສານອາຫານເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ.
 - ໃບຊາຖືກຜົນກະທົບຈະປ່ຽນສີແດງຊ້າ, ສີໃບໄມ້ແຫ້ງແລະສີມ້ວງ, ຢູ່ທາງໜ້າໃບໄມ້ ຈະມີຂີ້ຝຸ່ນສີຂາວເປື່ອນຫຼາຍ.
 - ໃບຊາທີ່ຖືກຜົນກະທົບໜັກ ຂອບຂອງໃບຊາຈະກົງຂຶ້ນ, ໃບຊາຫຼົ່ນ, ຍອດມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ=>ກຳລັງການຜະລິດຫລຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
 - ຜົນກະທົບຮອບປີ; ສິ່ງຜົນກະທົບແຮງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂອາກາດແດດຮ້ອນແລະແຫ້ງແລ້ງ.
- ການປ້ອງກັນ
 - ປູກແລະອານຸລັກຮັກສາຕົ້ນຊາໃຫ້ແຂງແຮງ, ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີແລະຄົບສານບຳລຸງ.
 - ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮົ່ມແລະເອົາເຟືອງປົກໃຫ້ຊຸ່ມ.
 - ເກັບເດັດໃບຊາຕາມລຸ້ນ, ອະນາໄມແລະຂ້າສັດຕູພືດ.
 - ຝົນຕົກລົນເຮັດໃຫ້ລ້າງແມງແດງອອກຈາກໃບຊາ, ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ຢາປ້ອງກັນສັດຕູພືດ.

3.5. ແມງເພັຍສີດຳ



ແມງເພັຍສີດຳຈັບຢູ່ຍອດຊາ



ແມງເພັຍສີດຳໃຫຍ່ບໍ່ມີປີກ ແລະ ໂຕອ່ອນ



- ຜົນກະທົບ
 - ແມງເພັຍສີດຳຢູ່ເປັນກຸ່ມ ຈັບຕາມໃບອ່ອນ: ຍອດຊາ, ໃບອ່ອນ, ດອກ, ໜາກອ່ອນ.
 - ດູດສານບຳລຸງຈາກຕົ້ນເຮັດໃຫ້ຍອດອ່ອນ, ໃບອ່ອນເຊື່ອມຄຸນນະພາບ. ບັນດາໃບອ່ອນ, ແຂງ ແລະ ມີສີຂຽວກາຍເປັນສີເຫລືອງຂາວ...
 - ເພັຍຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂດີໃນການຂະຫຍາຍຕົວ.
 - ບ່ອນທີ່ເພັຍທຳລາຍ, ຫລັງຈາກເວລາຜ່ານໄປໃບອ່ອນຈະກາຍເປັນສີດຳ.

- ການປ້ອງກັນ.
 - ຕັດຕົ້ນຫຍ້າອ້ອມຂ້າງຕົ້ນຊາ.
 - ເດັດຊາຕາມລຸ້ນຂອງຊາເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເກີດເພັຍ.
 - ປ້ອງກັນແມງໄມ້(ແມງເຕົ້າທອງ, ແມງໄມ້ປີກແຂງ, ເຜິ້ງບາງຊະນິດ....)
 - ຕິດຕາມສວນຊາໃຫ້ໄລຍະການປ່ຽນແປງລະດູ (ຈາກລະດູໜາວເປັນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ; ລະດູຮ້ອນເປັນລະດູບານ ໃຫມ່) ເພື່ອກຳຈັດເພັຍ.....
 - ເດັດຍອດອ່ອນ, ກິ່ງງ່າທີ່ມີເພັຍຈັບຫລາຍ.

3.6. ແມງບຶງຂົນທຳລາຍຊາ

- ຜົນກະທົບ.
 - ກິນບັນດາໃບຊາແກ່ຫລາຍ, ກິນໃບອ່ອນໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າຖ້າກິນໃບອ່ອນມັນຈະກິນທັງໝົດໃບເລີຍ.
 - ບຶງອ່ອນ1-2ກິນທາດສີຂຽວຢູ່ກ້ອງໃບ. ບຶງອາຍຸ 3 ຂຶ້ນໄປຈະກິນທັງໝົດໃບ ຈຶ່ງເຫລືອໄວ້ພຽງແຕ່ໃບໃບ.
 - ຕົ້ນຊາທີ່ຖືກບຶງກິນຈະເຮັດໃຫ້ການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຊ້າລົງ.
- ການປ້ອງກັນ.
 - ດູແລຮັກສາສວນຊາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ.
 - ໃຊ້ໄຟເພື່ອຈັບແມງໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ(ແມງກະເບື້ອ...) ໃນທຸກໆຕອນແລງໃນ 7-10 ມື້.
 - ຕັດຫຍ້າອ້ອມບໍລິເວນຕົ້ນຊາທີ່ຖືກທຳລາຍ.
 - ຕັດເອົາໃບທີ່ມີໄຂ່ບຶງ, ກຳຈັດບຶງອາຍຸ 1-2 ໄປທຳລາຍ.



ແມງບຶງຂົນທຳລາຍຊາ

3.7. ໜອນສີແດງ


- ຜົນກະທົບ.
 - ໜອນສີແດງຜົນກະທົບກັບງ່າຂຶ້ນ 3, 4 ແລະ ລຳງ່ານ້ອຍ.
 - ງ່າທີ່ຖືກທຳລາຍຈະແຫ້ງແຫ້ງ, ຖ້າໜອນກິນຢູ່ຕົ້ນງ່າຈະໃຫ້ງ່າແລະໃບຄ່ອຍໆແຫ້ງ, ງ່າທີ່ຢູ່ຈຸດທີ່ໜອນເຈາະຈະຫັກໄດ້ງ່າຍ.
 - ໜອນຈະກັດກິນແກ່ນໃຈກາງຂອງລຳງ່າໝົດແລ້ວຈຶ່ງເຈາະເຂົ້າໄປກິນລຳຕົ້ນໃຫຍ່ແລະ ກິນຕໍ່ຈົນໄປຮອດປາຍຕົ້ນໃຫຍ່, ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາແຫ້ງແຫ້ງ.
 - ໃນ 1 ປີມີສອງລຸ້ນໜອນ.
 - + ລຸ້ນ 1 ໜອນຈະທຳລາຍຫລາຍໃນເດືອນ 4-5 ຮອດເດືອນ 9.
 - + ລຸ້ນ 2 ໜອນຈະທຳລາຍຫລາຍໃນເດືອນ 1-3.

- ວິທີການປ້ອງກັນ.
 - ທຸກປີຕ້ອງຕັດຕອນຊົງພຸ່ມຕົ້ນຊາ, ຕັດບັນດາງ່າທີ່ແຫ້ງແລ້ວຈູດຖິ້ມ.
 - ກວດກາຕັດງ່າທີ່ແຫ້ງໃນຊ່ວງທີ່ມີລຸ້ນໜອນເກີດຂຶ້ນ

3.8. ເພັຍຂາວ, ເພັຍແດງ



ເພັຍຂາວ



ເພັຍແດງ

- ຜົນກະທົບ
 - ທຳອິດຈະເຫັນເປັນຈຸດນ້ອຍໆສີຂາວປະມານ 1-3 ມິລິແມັດ ຈັດຢູ່ຕາມ.
 - ພົບກັບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ເພັຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ເປັນຜົນກະທົບໃຫ້ກັບໃບຊາ, ກ້ານໃບ, ກ້ານດອກ, ຕົ້ນຊາ.
 - ເພັຍຊະນິດນີ້ຈະຈັບບໍ່ເໝັງຕິງຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ, ດູດສານບຳລຸງເຮັດໃຫ້ໃບຊາຄ່ອຍໆເຫລືອງ. ຖ້າຫາກປະໂຫຍດເພັຍແຜ່ຫລາຍໄປກວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາຕາຍແຫ້ງແຫ້ງ.
 - ລະດູຮ້ອນ, ເພັຍຈະໄດ້ລົງລຳຕົ້ນ, ດູດສານອາຫານເຮັດໃຫ້ຮາກຊາຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ, ໃບຄ່ອຍໆເຫລືອງແຫ້ງ.
- ວິທີການປ້ອງກັນ.
 - ຕັດງ່າເຮັດໃຫ້ອາກາດລວງຖ່າຍເທົ່າໃຫ້ສວນຊາ, ທຳຄວາມສະອາດຫຍ້າ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອ້ອມຂ້າງຕົ້ນຊາ.
 - ໃຫ້ຕັດບັນດາງ່າທີ່ຖືກທຳລາຍຮຸນແຮງ, ຕັດຈົນຈຳແລ້ວນຳໄປທຳລາຍ(ຈູດ).
 - ເຖິງວ່າເບື້ອງຕົ້ນຈະມີເພັຍໜ້ອຍກໍຕາມແມ່ນໃຫ້ຈັດການເລີຍ.

3.9. ພະຍາດໃບໂພງ



ພະຍາດໃບໂພງເກີດກັບໃບອ່ອນປານກາງ



ພະຍາດໃບໂພງເກີດກັບໃບແກ່

- ຜົນກະທົບ
 - ຜົນກະທົບຢູ່ໃບອ່ອນ, ຍອດອ່ອນ... ຖ້າເປັນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ໃບອ່ອນແລະຍອດຊາຫລົ່ນ.
 - ເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດຫຼຸດລົງ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເກີດໃຫມ່ຂອງຊາຫຼຸດລົງ.
 - ພະຍາດໃບພອງຈະຂະຫຍາຍຕົວເມື່ອເວລາອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 15-20 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊຸ່ມຫລາຍກວ່າ 90%ແລະທີ່ສຸດແມ່ນມີນ້ຳໜອກຫລືຝົນຝອຍແກ່ຍາວ 15 ມື້ຂຶ້ນໄປ.
- ວິທີການປ້ອງກັນ
 - ຖ້າເຫັນມີໃບໂພງແມ່ນໃຫ້ເດັດຖິ້ມເລີຍ, ເດັດໃຫ້ຫມົດໃບທີ່ເຫັນວ່າໂພງແລ້ວນຳໄປທຳລາຍ.

3.10. ພະຍາດປາຍແຫ້ງ

- ຜົນກະທົບ
 - ສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຢູ່ທາງສ່ວນປາຍຂອງຍອດຊາເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊາຫຼຸດລົງ.
 - ທຳອິດເບິ່ງຄາຍຄືກັບຮອຍເຂັມປັກເປັນສີດຳ, ປະໄວ້ດິນຈະຂະຫຍາຍຕົວເປັນວົງກວ້າງ, ງ່າອ່ອນ ແລະ ຍອດອ່ອນຈະແຫ້ງຕາຍ ແລະ ຫລົ່ນ.
 - ພະຍາດຊະນິດນີ້ຈະບໍ່ລາມໄປຮອດຕົ້ນແກ່ ແຕ່ຈະທຳລາຍພາກສ່ວນທີ່ອ່ອນ ແລະ ຈະຢຸດຫລັງຈາກທີ່ງ່າອ່ອນເໝົາຕາຍແລ້ວ.
 - ພະຍາດປາຍແຫ້ງມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ອຸນຫະພູມປະມານ 27 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊຸ່ມຫລາຍກວ່າ 90%.
 - ພະຍາດຊະນິດນີ້ຈະມີຜົນກະທົບໜັກໃນລະດູຝົນ, ໃນລະດູທີ່ມີອາການຮ້ອນຊຸ່ມທີ່ສຸດ (ເດືອນ 7-9)
- ວິທີການປ້ອງກັນ
 - ເມື່ອເຫັນພະຍາດແມ່ນໃຫ້ເດັດຖິ້ມ, ເດັດໃຫ້ຫມົດບັນດາປາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ວນຳໄປທຳລາຍ.



ຍອດຊາເກີດພະຍາດ

3.11. ພະຍາດໃບແຫ້ງ



ອາການພະຍາດໃບແຫ້ງ

- ຜົນກະທົບ
 - ພະຍາດນີ້ສ່ວນຫລາຍເກີດກັບໃບຊາທີ່ແກ່.
 - ຮອຍພະຍາດໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະເປັນຮອຍຈຳສີໃບໄມ້ແຫ້ງສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຢູ່ກາງໃບຫລັງຈາກນັ້ນແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຫມົດທັງໃບ.
 - ຮອຍພະຍາດເປັນຄືກັບຄືນນ້ຳ, ທາງນອກສຸດມີຂອບເປັນສີໃບໄມ້ແຫ້ງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າເປັນໜັກສາມາດເຮັດໃຫ້ໃບຄືໄຟໄໝ້, ຫລຸດຜ່ອນກຳລັງການຜະລິດ,...
 - ພະຍາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອຸນຫະພູມ 25-28 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊຸ່ມສູງສ່ວນຫລາຍແມ່ນລະດູຝົນ.
- ວິທີການປ້ອງກັນ
 - ຮັກສາສວນຊາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ.
 - ກຳຈັດໃບທີ່ຕິດພະຍາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນກຳເນີດຂອງພະຍາດໃນປີຕໍ່ໄປ.
 - ໃຫ້ຝຸ່ນພຽງພໍ, ທຳຄວາມສະອາດຫຍ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຊາຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຕັມທີ່.
 - ເມື່ອເວລາຕັດຕອນຊາແມ່ນໃຫ້ບີບແໜ້ນ ເພື່ອທຳລາຍຕົ້ນກຳເນີດຂອງພະຍາດ.

3.12. ພະຍາດໃບແຫ້ງແຫ້ວ



ອາການພະຍາດໃບແຫ້ງແຫ້ວ

- ຜົນກະທົບ
 - ຮອຍພະຍາດຊະນິດນີ້ມີສີແຫ້ງແຫ້ວເປັນຮູບຄືນງ່ຽມ, ທຳອິດເປັນຮອຍຈຳສີດຳນ້ອຍໆ ຫລັງຈາກນັ້ນແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ.
 - ພະຍາດຊະນິດນີ້ມັກຈະເປັນຢູ່ປາຍໃບແລະເຮັດໃຫ້ໃບຫຼົ່ນ.
 - ໃບຈະຫຼົ່ນພາຍຫລັງທີ່ພະຍາດແຜ່ໄປໄດ້ 1/2 ຂອງໃບ.
 - ພະຍາດຊະນິດນີ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມສູງ, ເປັນໜັກຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 6-8.
- ວິທີການປ້ອງກັນ
 - ຮັກສາສວນຊາ, ກຳຈັດຫຍ້າ
 - ທຳຄວາມສະອາດສວນຊາ, ເກັບກວດໃບຫລັງຈາກທຳການຕັດຕອນ.

